

# ialuset® Plus krém

## Fertőzött és égett sebek gyógyítására

Hialuronsav és ezüst-szulfadiazin alapú krém (25 g-os tubus)

### TULAJDONSÁGOK

A hialuronsav a bőr egyik alapösszetevője. A gyógyulás minden fázisában fontos szerepe van. Felgyorsítja a gyógyulást, és a sérült bőr hámjának újraképződését. Nagy vízmegkötő képessége révén a szöveti újraképződési folyamatok számára kedvező nedves közeget biztosít. Az ialuset® Plus krémben lévő hialuronsavat bio-fermentációval állították elő. Az ezüst-szulfadiazin összetevő erős antimikrobás hatással rendelkezik, leginkább a Gram-negatív baktériumok ellen.

### JAVALLAT

Az ialuset® Plus fertőzött és égett seb kezelésére, bakteriális eredetű bőrbetegségekre, illetve olyan esetekben javasolt, amikor másodlagos fertőzés kialakulása könnyen bekövetkezhet.

### HASZNÁLAT

A seb megtisztítása és fertőtlenítése után a krémet 2-3 mm vastagon közvetlenül a sebre kell tenni. Alternatív megoldásként a krémet a steril gézlapra lehet kenni, majd a gézlap sebre helyezése után a géz rögzítése a seb megfelelő kötözésével történik. Minden kezelés előtt javasolt a seb fiziológiás oldattal történő megtisztítása. Naponta egyszer kell alkalmazni a teljes sebgyógyulásig. A krém tiszta csapvízzel távolítható el. **A seb és égés gyógyulásának folyamatát az orvosnak kell értékelnie. A kezelés teljes ideje ne legyen több egy hónapnál.**

### ÖSSZETEVŐK

A krém tartalmaz 0,2% hialuronsavat (nátriumsó formájában), és 1% ezüst-szulfadiazint. Egyéb összetevők: olajsav-decilészter (ceteraril-alkohol, nátrium-lauril-szulfát és nátrium-cetearil-szulfát), Makrogol, folyékony szorbitol, glicerin és víz.

### NEM KÍVÁNT HATÁSOK

Ritkán előfordulhat helyi túlérzékenységi reakció, mint pl. ekcéma.

### ELLENJAVALLATOK

Ismert általános vagy helyi túlérzékenység a szulfadiazinra (kontakt ekcéma). Túlérzékenység bármely összetevőre. Megfelelő adatok hiányában az ialuset® Plus használata ellenjavallt a terhesség végén, szoptatás során, újszülötteknél és koraszülötteknél.

**FORDULJON ORVOSHOZ VAGY GYÓGYSZERÉSZHEZ HA BÁRMILYEN NEM KÍVÁNT HATÁST TAPASZTAL, AKKOR IS HA AZ NEM SZEREPEL A FELSOROLÁSÁBAN.**

### ELŐZETES FIGYELMEZTETÉSEK

- A seb, az égés és a környező bőrterület tisztítására és fertőtlenítésére megfelelő módszert alkalmazzon! Az ialuset plus krém enzimikus lemosókkal történő együtt használata nem került értékelésre.
- Ügyeljen, hogy az ialuset® plus krémmel kezelt területet ne érje napfény (a fényérzékenység kockázata miatt)! Elszíneződés jelenhet meg a sebágyon, ami egyszerű lemosással eltávolítható.
- Vese – vagy májbetegség esetén nyílt seben ne alkalmazza!
- Gyermekektől távol tartandó!
- Szájon át nem alkalmazható! Csak külsőleg!
- Figyeljen arra, hogy a tubus ne érintkezzen közvetlenül a sebbel!
- Minden használat után figyelmesen helyezze vissza a kupakot!
- Ne alkalmazza, ha sérült a közvetlen csomagolás!
- A lejárt, vagy fel nem használt terméket ne dobja el. Vigye vissza a patikába, hogy a megsemmisítése megfelelő legyen.

**AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜL FEL, BESZÉLJE MEG ORVOSÁVAL VAGY GYÓGYSZERÉSZÉVEL.**

### TÁROLÁSI FELTÉTELEK

**NE HASZNÁLJA FEL A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETETT LEJÁRATI IDŐ UTÁN.**

30°C alatti hőmérsékleten, fénytől védve.

A tubus a felbontása után 6 hónapon belül felhasználható.

A CE jelzés kiadás éve: 2000

A tájékoztató utolsó ellenőrzésének dátuma: 2016. június

### GYÁRTÓ

Laboratoires Genévrier SA,  
280 rue de Goa – Z.I.Les 3 Moulins  
Parc d'activités de Sophia Antipolis  
06901 Sophia Antipolis, Franciaország

### Magyarországon a forgalmazásért felelős

IBSA Pharma Kft.

1124 Budapest, Fodor u 54/B Tel: (1) 225 7775 Fax: (1) 201 77 72

CE 0344

STERILE R

